令和４年（2022 年）産

麦生育診断情報（第５報）

令 和 ４年 ５月 １８日
愛知県農業総合試験場
作物研究部作物研究室

１．３月以降の気温の推移 （農総試:長久手市）



注） 日平均気温は、毎正時平均気温。平年気温は 2001～2020 年の 20 年間の平年値。

２．「きぬあかり」の予測成熟期 （出穂期を起点とする。長久手市:5 月 16 日現在。）

出穂期	本年予測成熟期（平年対比）						平年成熟期（登熟日数）	
	高温傾向（＋1℃）		平年並み（±0℃）		低温傾向（－1℃）			
3/30	5/24	(4 日早)	5/24	(4 日早)	5/25	(3 日早)	5/28	(59 日)
4/5	5/26	(4 日早)	5/27	(3 日早)	5/27	(3 日早)	5/30	(55 日)
4/10	5/29	(3 日早)	5/30	(2 日早)	5/31	(1 日早)	6/1	(52 日)
4/15	6/2	(1 日早)	6/4	(1 日遅)	6/5	(2 日遅)	6/3	(49 日)
4/20	6/5	(1 日早)	6/6	(±0 日)	6/8	(2 日遅)	6/6	(47 日)
4/25	6/8	(1 日早)	6/10	(1 日遅)	6/12	(3 日遅)	6/9	(45 日)
4/30	6/12	(±0 日)	6/13	(1 日遅)	6/15	(3 日遅)	6/12	(43 日)
5/5	6/14	(1 日早)	6/16	(1 日遅)	6/18	(3 日遅)	6/15	(41 日)

注 1. 予測成熟期は出穂期からの有効積算気温（Σ（日平均気温－7℃））が 520℃を越えた日とした。
注 2.　5 月 16 日までは農総試で観測された日平均気温を用いた。5 月 17 日以降は農総試の平年気温を用いて計算した。 日平均気温が平年より1℃高い場合を高温傾向、平年より1℃低い場合を低温傾向として計算した。

3.「ゆめあかり」の予測成熟期 （出穂期を起点とする。長久手市:5 月 16 日現在。）

出穂期	本年予測成熟期（平年対比）						平年成熟期（登熟日数）	
	高温傾向（＋1℃）		平年並み（±0℃）		低温傾向（－1℃）			
3/30	5/23	(3 日早)	5/23	(3 日早)	5/24	(2 日早)	5/26	(57 日)
4/5	5/25	(3 日早)	5/26	(2 日早)	5/26	(2 日早)	5/28	(53 日)
4/10	5/29	(2 日早)	5/29	(2 日早)	5/30	(1 日早)	5/31	(51 日)
4/15	6/2	(1 日早)	6/3	(±0 日)	6/4	(1 日遅)	6/3	(49 日)
4/20	6/5	(1 日早)	6/6	(±0 日)	6/7	(1 日遅)	6/6	(47 日)
4/25	6/8	(1 日早)	6/10	(1 日遅)	6/11	(2 日遅)	6/9	(45 日)
4/30	6/12	(±0 日)	6/13	(1 日遅)	6/15	(3 日遅)	6/12	(43 日)
5/5	6/15	(1 日早)	6/16	(±0 日)	6/18	(2 日遅)	6/16	(42 日)

注 1. 予測成熟期は出穂期からの有効積算気温（Σ（日平均気温－5℃））が 610℃を越えた日とした。
注 2.　5 月 16 日までは農総試で観測された日平均気温を用いた。5 月 17 日以降は農総試の平年気温を用いて計算した。日平均気温が平年より 1℃高い場合を高温傾向、平年より1℃低い場合を低温傾向として計算した。