水稲生育診断情報（第５報）

令 和 ４年 ８月 ２９日
愛知県農業総合試験場
作物研究部作物研究室

１　水稲生育期間中の気温の推移　（農総試：長久手市）



注1）日平均気温は毎正時気温の平均値である。
注2）平年気温は 2001 年から 2020 年までの 20 年間の平均値を用いた。

２　成熟期予測（農総試：長久手市、令和4年8月28日現在）

「ゆめまつり」及び「あいちのかおりSBL」

出穂期 月/日	成熟期(登熟期間) 8 月 29 日以降の気温の推移 +2℃	+1℃	平年並み	−1℃	−2℃
8/8	1 日早	1 日早	9/15(38 日)	1 日遅	2 日遅
8/10	1 日早	±0 日	9/17(38 日)	1 日遅	2 日遅
8/12	2 日早	1 日早	9/20(39 日)	1 日遅	2 日遅
8/14	2 日早	1 日早	9/22(39 日)	1 日遅	3 日遅
8/16	3 日早	2 日早	9/25(40 日)	1 日遅	2 日遅
8/18	2 日早	1 日早	9/27(40 日)	1 日遅	3 日遅
8/20	2 日早	1 日早	9/29(40 日)	2 日遅	4 日遅
8/22	3 日早	2 日早	10/2 (41 日)	2 日遅	4 日遅
8/24	4 日早	2 日早	10/5 (42 日)	2 日遅	4 日遅
8/26	3 日早	2 日早	10/7 (42 日)	3 日遅	5 日遅
8/28	4 日早	2 日早	10/10(43 日)	2 日遅	5 日遅

注1）予測に用いた気温は、農総試(長久手)の8月28日までの本年実測値及び8月29日以降の平年値を用いた。
注2）成熟期予測は、農総試(長久手)の平均気温を用いて下記の式により算出した。
「ゆめまつり」及び「あいちのかおりSBL」：Σ（日平均気温）＝1002℃＝刈り取り適期